



santa casa de misericórdia de pirassununga

Título: **DESPREZAR DIURESE**

Data da Criação: 01/08/2017

Data da Revisão: 07/11/2022

Próxima Revisão: em 2 anos

Paginação: Capa

DESPREZAR DIURESE

Elaborado por: Nome: Thulssa Auxiliadora Gomes Medeiros dos Santos Francisco Gilberto Vasconcelos Monteiro	Revisado por: Nome: Regiana Luzia Bruner Nagata Thulssa Auxiliadora Gomes Medeiros dos Santos	Aprovado por: Nome: Marcelo Martinelli Miguel Dr. Marcelo Martinelli Miguel Cirurgia Geral CRM 135.049
Enfermeira SCIH e Núcleo de Segurança do Paciente Médico Infectologista CCIH e Núcleo de Segurança do Paciente	Função: Enfermeira Responsável Técnica da Enfermagem Enfermeira SCIH e Núcleo de Segurança do Paciente	Função: Diretor Técnico
Assinatura: Data: 07/11/2022	Assinatura: Data: 08/11/2022	Assinatura: Data: 07/11/2022

Thulssa A. C. Medeiros dos Santos
COREN/SP 210.859 - ENF

Regiana Luzia Bruner Nagata
COREN/SP 146.6
Thulssa A. C. Medeiros dos Santos
COREN/SP 210.859 - ENF

Título: DESPREZAR DIURESE

Data da Criação: 01/08/2017

Data da Revisão: 07/11/2020

Próxima Revisão: em 2 anos

Paginação: 1

1. INTRODUÇÃO

A monitorização do débito urinário através da sondagem vesical é muito importante, pois fornece dados que possibilitam avaliar a função renal do paciente e suas condições hemodinâmicas e auxiliar no diagnóstico de doenças específicas.

É possível verificar também a filtração renal se está havendo retenção ou excesso de eliminação. O controle deverá ser rigoroso, sendo que, no qual se consegue obter dados para um melhor diagnóstico e tratamento.

2. OBJETIVO:

Desprezar diurese de pacientes que se encontram com sonda vesical de demora, com o intuito de esvaziar a bolsa coletora através de recipiente individual e descartável.

3. CAMPO DE APLICAÇÃO:

Equipe de enfermagem.

4. REFERÊNCIA:

Paciente crítico: diagnóstico e tratamento: Hospital Sírio-Libanês / editores Guilherme Schettino... [et al]. – Barueri, SP: Manole, 2006.

Agencia Nacional de Vigilância Sanitária. **Intervenção e Medidas de Prevenção e Controle da Resistência Microbiana:** infecção do trato urinário relacionada a cateter vesical. Disponível em: http://www.anvisa.gov.br/servicosauade/controle/rede_rm/cursos/rm_controle/opas_web/modulo5/pre_urinario4.htm. Acesso em: 20 nov. 2020.

5. TERMINOLOGIA, DEFINIÇÃO E SÍMBOLO:

Não se aplica.

6. DESCRIÇÃO:

PROFISSIONAL	PROCEDIMENTO	PASSO
Equipe de Enfermagem	Desprezar diurese de pacientes que se encontram com sonda vesical de demora	• Conferir a prescrição de enfermagem e/ ou

Título: DESPREZAR DIURESE

Data da Criação: 01/08/2017

Data da Revisão: 07/11/2020

Próxima Revisão: em 2 anos

Paginação: 2

médica;

- Solicitar no sistema através do código 5831 – coletor de urina tipo saco 2000mL sistema aberto;

- Higienizar as mãos;

- Providenciar o material necessário;

- Conferir a pulseira de identificação com os dados do prontuário do paciente;

- Explicar o procedimento ao paciente;

- Calçar luvas de procedimento;

- Esvaziar a bolsa coletora através de recipiente individual e descartável, evitando o contato do tubo de drenagem com o recipiente coletor;

- Não é recomendado o esvaziamento simultâneo de vários pacientes com um mesmo recipiente, devido ao risco de contaminação cruzada;

- Medir o volume urinário através da graduação do saco plástico e observar os aspectos da urina tais como coloração e odor;

- Desprezar a urina e descartar o saco plástico graduado no resíduo infectante;

- Retirar as luvas e higienizar as mãos;

- Registrar no prontuário do paciente as

Título: DESPREZAR DIURESE

Data da Criação: 01/08/2017

Data da Revisão: 07/11/2020

Próxima Revisão: em 2 anos

Paginação: 3

características da urina tais como cor e odor e o volume urinário.

Obs: - O colaborador deverá identificar na prescrição médica e/ou de enfermagem a ação prescrita: desprezar diurese, sendo o intervalo de horas e a quantidade de vezes necessária de descarte e mensuração de diurese de acordo com as necessidades individuais de cada paciente e rotina do setor;

- Esvaziar a bolsa coletora regularmente, sempre que atingir metade de sua capacidade. Não espere que a bolsa fique cheia de urina.

7. CONTROLE DE REGISTROS:

Prontuário do paciente e impresso específico.